

**Aasta puu 2007**

## Harilik saar

*Fraxinus excelsior*

**Rahvasuus: saarnas,  
saarepuu, saarn, saar**

**Sugukond: õlipuulised**

**Perekond: saar**

**Kõrgus kuni 35 m**

**Eluiga kuni 200 aastat**



Esineb laial alal Euroopas ja Aasia lääneosas. Eestis tavaline, enam Lõuna- ja Kesk-Eestis. Mullaviljakuse suhtes nõudlik ning tundlik heitgaaside ning tahma suhtes.

Saarel on nii emas- kui isasõisi, kuid leidub ka mõlemasugulisi. Asuvad 4-12 cm pikkustes violetjates või tumepruunides pööristes. Õitseb mai keskel enne lehtede puhkemist, tuultolmleja.

Vili on pähklike, mõlemast otsast tömp ja pruunikas. Valmivad septembris, oktoobris, puule jäävad sageli kevadeni.

Saar on hinnaline puit. Seda kasutatakse mööbli, vineeri, parketi ja suuskade tootmiseks, vanasti tehti ka vankreid ja regesid. Saare puit on kõrge kütteväärtusega.

Rahvameditsiinis on kasutatud koort, seemneid ja lehti (eriti vastpuhkenuid) eelkõige neis sisalduvate eeterlike õlide tõttu. Koort on tarvitatud ka naha parkimisel ja musta, pruuni ning sinise värvi saamisel. Lehti ja võrseid on antud söögiks lammastele.